LES PIQURES D'HYMÉNOPTÈRES

Qu'est-ce que les hyménoptères?











Abeille domestique

Bourdon terrestre

Guêpe commune

Frelon européen

Frelon asiatique

Spécificités des piqûres :

Lors d'une piqûre d'abeille, l'aiguillon est arraché du corps de l'insecte et reste dans la peau en continuant à injecter du venin. Les piqûres d'abeille surviennent essentiellement au printemps et au début de l'été. Après avoir piqué, l'abeille meurt.

Lors d'une piqûre de guêpe ou de bourdon, l'aiguillon ne reste que très rarement dans la peau. Ces insectes peuvent donc piquer à plusieurs reprises.

Lors d'une piqûre de frelon, le dard est plus long, la piqûre est plus profonde. Le venin peut être injecté directement dans les vaisseaux sanguins, accélérant ainsi la réaction.

Quelle prévention?

- Inspecter les zones d'espaces verts avant intervention pour repérer la présence éventuelle de nids.
- Porter des gants lors des travaux à l'extérieur.
- Porter des vêtements couvrants, manches longues, pantalons, chapeaux, de préférence à couleur claire et des chaussures de sécurité ou des bottes.
- Éviter de porter du parfum (eau de toilette, crème solaire parfumée...)
- Boire au verre (risque d'introduction de l'insecte dans une canette)
- Rester à bonne distance des poubelles mal fermées, enlever les restes de nourritures et de boissons sucrées lors des repas à l'extérieur.
- Éviter le travail isolé.
- · Former les agents au secourisme
- Avoir une trousse de secours et un moyen de communication en s'assurant de la couverture réseau.





Si connaissance de réaction allergique : la personne doit avoir en permanence en sa possession un traitement antihistaminique ou corticoïde par voie orale ou un kit d'adrénaline auto injectable prescrit par son médecin traitant. Informez votre employeur et vos collègues de travail.

Pôle Qualité de vie au travail Service Prévention

Création: 02/04/2024

Quelle prévention?

En cas d'attaque les vibrations et le bruit provoquent défense et agression chez ces insectes	En cas de piqûre
 ne pas bouger si très proche repousser doucement : éviter les gestes brusques s'éloigner, se baisser se mettre sous l'eau ou à l'abri dans un endroit clos ne pas s'agiter, ne pas paniquer en cas de forte attaque : courir en zig zag déroute les assaillants 	 Rester calme Repérer la (les) zone(s) piquée(s) et identifier si le dard est toujours présent (dans ce cas retirer le plus rapidement possible (petit point noir) avec l'ongle ou carte de crédit (éviter la pince à écharde ou à épiler au risque de faire éclater la glande à venin) En cas de piqûre à la main, enlever vos bagues et bracelets pour ne pas gêner la circulation sanguine en cas de gonflement. Laver à l'eau et au savon puis appliquer un antiseptique Surélever le membre piqué Vérifier la vaccination anti tétanique, la piqûre doit être considérée comme une plaie

Les différents types de réactions possibles :

- Les réactions locales : sur une durée de 3-4 heures, douleur, rougeur, durcissement et épaississement de la peau
- Les réactions toxiques : maux de tête, vomissement, urticaire, baisse de la tension artérielle, oppression thoracique, malaise...
- Les réactions allergiques : rougeur, gonflement général, asthme, difficulté respiratoire, sudation, vomissement, perte de connaissance voire décès.



Le nombre de pigûres augmente le risque de réaction allergique.


En cas de réaction allergique avec signes généraux,

appeler immédiatement les secours



15,18,112

Appliquer les consignes habituelles de secourisme notamment en cas de détresse respiratoire, de perte de connaissance, d'arrêt cardiaque.



CDG 70

Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Hazter-Sadne

Pôle

Pôle Qualité de vie au travail Service Prévention

Création: 02/04/2024